

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DES DENTS DE SAGESSE ?

Les troisièmes molaires appelées « dents de sagesse » sont localisées aux extrémités les plus en arrière sur chaque mâchoire. Normalement, la croissance de la tête s'effectue dans les trois plans de l'espace (de haut en bas, de droite à gauche et d'avant en arrière). Lorsque celle-ci est insuffisante vers l'arrière, les dents de sagesse auront des difficultés à se mettre en place sur les arcades dentaires. Elles seront dites alors **incluses** (totalement enfouies dans l'os) ou **semi incluses** (apparition partielle de la dent dans la gencive).



Situations d'éruption des dents de sagesse et leur traitement par le dentiste

- Si la dent vient se placer normalement sur l'arcade et que son axe est convenable **il est important de la conserver**.
- **Si la dent est semi incluse avec un axe convenable**, mais possède une racine non mature, on attendra la fin de sa croissance en surveillant qu'elle ne se carie pas (car son nettoyage n'est pas aisé).

- **Si la dent semi incluse n'a pas un axe correct**, elle doit être retirée rapidement pour éviter des douleurs gingivales, et pour éviter qu'elle déplace les dents situées en avant d'elle, et ceci quelque soit la maturité de ses racines.



Dent semi incluse mal orientée



Dent semi incluse conséquences

- **Si la dent est totalement incluse mais bien dans l'axe d'éruption** et qu'elle possède un emplacement suffisant pour se placer sur l'arcade, le praticien se limitera à la surveillance de cette dent.

- **Si la dent est totalement incluse mais horizontale ou qu'il n'y a pas de place** pour lui permettre de pousser normalement, le praticien doit la retirer.



Dent de sagesse incluse barrée



Dent de sagesse barrée

Votre dentiste complice de votre santé

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DES DENTS DE SAGESSE ?

Comment évoluent les dents de sagesse ?

L'évolution se fait par à-coup. Il existe des périodes de croissance et des périodes de repos. Lorsque l'enfant grandit rapidement, l'éruption de ses dents est très fortement ralentie. En général les dents de sagesse sortent de la gencive vers les 18 ans de l'adolescent. Certaines dents n'existent pas : on parle alors d'agénésie dentaire. Ce phénomène est très fréquent pour les dents de sagesse, mais parfois il concerne également d'autres dents comme les canines ou les incisives. Pour connaître la maturité des dents, il suffit d'observer l'aspect de leur racine. Une racine totalement formée est en forme de pointe de lance. Si la racine apparaît tronquée sur le cliché radiologique, la dent n'a pas terminé sa croissance.



En bas germe dent de sagesse en haut dent semi-incluse

>>> L'AUTRE FICHE À LIRE ET LIÉE À CE SUJET

- Fiche conseils post-opératoires après une extraction dentaire

