

UN IMPLANT POUR REMPLACER UNE DENT

Une seule dent manquante peut provoquer des migrations ou une usure prématurée des autres dents, des problèmes de gencives et une mauvaise esthétique, des troubles digestifs dus à mastication insuffisante... Pour pallier à ces problèmes, votre dentiste va vous proposer de porter une prothèse dentaire.

Une dent manquante entraîne :

- des changements dans votre façon de parler et/ou de mâcher.
- des déplacements progressifs des dents contiguës ou antagonistes. Cela peut modifier la façon dont vos dents s'engrènent (occlusion) et créer plus de contraintes sur les dents restantes et sur les mâchoires.
- une perte osseuse à l'endroit de la dent manquante
- des changements de votre apparence, de votre sourire.

Pour pallier à ces problèmes, votre dentiste va vous proposer de poser un implant.



● Un implant peut être la solution à votre dent perdue

Rien ne remplace vos dents naturelles, mais un implant est l'élément qui s'en approche le plus. Cette technique n'est pas nouvelle mais se développe de plus en plus. L'implant dentaire est une racine artificielle le plus souvent en titane qui est placée chirurgicalement dans la mâchoire supérieure ou inférieure, et remplace la racine de votre dent manquante.

Sur cet implant sera fixée une couronne qui remplacera la dent absente. A l'inverse des bridges, l'implant ne nécessite pas que l'on touche les dents voisines de la dent absente.

● Comment se réalise un implant dentaire ?

La façon dont est placée l'implant dépend du cas clinique, du type d'implant et de la dent à remplacer. Le plus souvent les implants exigent deux ou trois étapes et ne peuvent être surmontés de la couronne (mise en charge) qu'après plusieurs mois de cicatrisation.

La plupart des implants nécessite 3 étapes :

• Pose de l'implant

Le dentiste pose l'implant dans la mâchoire. Des douleurs modérées et une inflammation peuvent survenir après l'intervention mais votre dentiste vous prescrira des médicaments antidouleur. Votre dentiste peut vous recommander une alimentation molle pendant le début de la cicatrisation.

• La cicatrisation

L'implantation sera solide si l'os autour de l'implant est parfaitement cicatrisé : on parle d'ostéointégration. Son temps moyen est de 4 mois.

• Remplacement de votre dent absente

Pour une dent unitaire, le dentiste réalisera une couronne. Elle aura la taille, la forme, l'aspect et la teinte de vos dents naturelles.

● Pouvez-vous recevoir un implant dentaire ?

Votre dentiste peut vous aider à prendre une décision si vous avez besoin d'un implant.

Un implant est possible si :

- **Votre état de santé général est bon.** Une maladie chronique comme un diabète peut ralentir le processus de cicatrisation et conduire à un échec de l'implant.

- **La qualité de votre os alvéolaire est bonne.** Si votre os s'est résorbé, la situation est plus compliquée mais vous pouvez malgré tout réaliser un implant. Parfois une greffe osseuse peut être réalisée pour améliorer le site de réception de l'implant.

- **Vous ne fumez pas.** Fumer est souvent une cause d'échec de l'implant.

Une bonne hygiène bucco-dentaire est importante pour le succès d'un implant. Vous devez veiller à ce que le site autour de l'implant reste bien propre. Votre dentiste peut vous recommander d'utiliser des brossettes interdentaires et d'utiliser un bain de bouche pour prévenir le risque d'inflammation gingivale.

Des visites régulières chez le dentiste sont également importantes pour garder votre implant et vos dents naturelles en bonne santé.

>>> L' AUTRE FICHE À LIRE ET LIÉE À CE SUJET :

- Fiche quelles prothèses pour ma bouche ?